



Hygiejne og smittebeskyttelse

- med Staldren® i kvægstalden



Generel anvendelse af Staldren® og Halamid

- Brug som udgangspunkt en god nævefuld Staldren® (50-100g) pr. m².
- Virkningen af Staldren® i brug aftager efter et par dage, og bør derfor gentages jævnligt.
- Virkningen af Halamidopløsning aftager efter en uge og hurtigere hvis det bliver beskidt. Skift derfor mindst én gang pr uge.

Indgang

- Skift fodtøj (og evt. tøj) og vask hænder. Desinficer hænder med Hand Des.
- Gå gennem støvlebad med 2 % Halamid eller ren Staldren®, inden du går ind i stalden.
- Ved sygdomsudbrud, kan du med fordel lave støvle/tøjskifte og hånddesinfektion før og efter tilsyn af syge dyr.

Sengebåse /Bindestald

- Staldren® strøes på det faste leje, hvor fugtighed kan give grobund for at bakterier og svampe, der kan forårsage yverbetændelse og klovlidelser
- Strø Staldren® på overfladen uanset om du anvender måtte eller sand, ca. 2 gange om ugen.
- Ved måtte, kan Staldren® mikses med den øvrige strøelse.
- Ved beskidte sengebåse øges dosering og hyppighed indtil der er opnået en passende tørhed.



Dybstrøelse, ungdyr og goldkøer

- Staldren® spredes ca. 2 gange ugentlig ovenpå strøelsen. Vær særlig opmærksom på fugtige pletter i strøelse og omkring drikkeautomater, hvor dosis skal øges for at forebygge vækst af bakterier og svampe.

Kælvningsboksen

- Rengør Kælvningsboksen grundigt efter hver kælvning. Vask med sæbe. Desinficer med 2-3 % Halamid mens boksen er fugtig.
- Når boksen er tør strøs med Staldren®. Herefter fyldes kælvningsboksen med frisk strøelse. På toppen af den friske strøelse drysses endnu et lag Staldren®.
- Drys Staldren® ovenpå strøelsen, langs kanter og på fugtige pletter dagligt så længe kalv og ko er i kælvningsboksen.

Kalveboksen/hytten

- Når en boks/hytte er tom. Rengør boksen/hytten med vand og sæbe. Desinficer med 2-3 % Halamid.
- Når boksen/hytten er tør fordeles Staldren® i bunden. Fordel strøelse ovenpå. Derefter drysses med endnu et lag Staldren® oven på strøelsen samt på sider og kanter af inventaret.
- I det daglige drysses med Staldren® 2-3 gange ugentligt på strøelse, fugtige pletter og langs kanter.
- Ved diarré udbrud anvendes Staldren® hver dag i boksen / hytten, indtil det er overstået.
- Ved flytning af kalve skal du være obs. på smitekilder undervejs. (F.eks. gødning, syge dyr m.m.)

Malkestalden

- Desinficer arealer med 2-3 % Halamid efter endt vask.
- Brug en opløsning med 0,3 % Halamid i Glycerin eller pattedyt til pattedesinfektion.
- Malkeudstyr desinficeres med 0,3-0,5 % Halamid opløsning. Skylles efter med rent vand.

Foderbordet/gange

- Gange og foderborde strøs jævnligt med Staldren® for at minimere risiko for smittespredning med maskiner, dyr og fodtøj.

Klovbad

- Læg Hygiejnemåtten med klovbad et sted hvor køerne går forbi til og fra malkestalden. Brug 1 % opløsning med Halamid.

Vandrør og drikkevand

- Halamid kan anvendes til desinfektion af vandrør (0,5 %), samt med 20 ppm i drikkevandet.

Staldren® JORENKU



Jorenku A/S
Teglværksvej 11
Tel.: +45 56 21 40 70
jorenku@jorenku.dk
www.jorenku.dk