

lokla[®] Multi

Beskrivning

Desinfektionsmedel för att doppa eller spraya spenar efter mjölkning

Kvaliteter

Avancerad jodbaserad formulering berikad med skyddande och återfuktande ämnen för de yttre lagren av epidermis.

lokla[®] Multi kombinerar och förstärker egenskaperna av jod utökat med dermatologisk effekt till ett utmärkt skydd av spenar efter mjölkning.

Användningen av **lokla[®] Multi** ger följande fördelar:

- Den höga desinficerande effekten av jod.
- Synlighet på spenen.
- Kosmetiska egenskaper

Egenskaper

Fysiska och kemiska egenskaper

Utseende	: brun vätska
Verksamt ämne	: jod (PVP)
pH av den rena produkten	: 2.3 +/- 0.5
Densitet vid 20 °C	: 1.00 -1.04
Frysningens känslighet	: 0 °C
Förvaringstemperatur	: 0 °C - 30 °C

Lagstiftning

loklar® Multi: Denna produkt innehåller ett anmält verksamt ämne enligt direktiv 98/8/EG och dess ändringar för typ 3 produkter: veterinärhygien.

Anmält aktiv substans: jod

Desinfektion

loklar® Multi testades enligt standardmetoden EN 1656 i ett brett spektrum av bakteriestammar. I detta första test, var förhållandena i enighet med standarden:

Testtemperatur	:	30°C
Koncentration	:	5%, 20% och 80%
Kontakt tid	:	30 minuter
Interferande ämne	:	1% skummjöl
Stammar	:	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541

Resultat: för alla testade stammar under förhållandena enligt standarden EN 1656, ger loklar® Multi en minskning med över 5 log.

I det andra testet, ändrades testförhållandena enligt följande:

Testtemperatur	:	20°C
Koncentration	:	70 %
Kontakt tid	:	30s, 2min och 10 minuter
Interferande ämne	:	10% och 20% hel UHT-mjöl
Stammar	:	<i>Escherichia coli</i> ATCC 10536 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Streptococcus uberis</i> ATCC 27958

Resultat: under dessa tuffare förhållanden, ger loklar® Multi en minskning med 5 log.

Andra tester, som kördes enligt metoden från den tyska byrån DVG, har visat effektiviteten av **loklar® Multi** på följande stammar:

Streptococcus uberis
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Streptococcus agalactiae
Streptococcus dysgalactiae
Pseudomonas aeruginosa
Streptococcus faecium
Proteus mirabilis

Användning

Användningsområde

Desinfektion av spenar efter mjölkning.
Användning av **loklar® Multi** rekommenderas särskilt till mjölgårdar med svåra hygieniska förhållanden.

Anvisningar

loklar® Multi är färdig att appliceras genom doppling eller sprayning efter mjölkning. Användning av **loklar® Multi** innebär även rengöring av spenarna innan följande mjölkning.

Utrustning

Manuell eller automatisk sprayning.
Spendopplingskopp med "non-return" funktion.

Toxicitet

loklar® Multi är inte giftig under normala användningsförhållanden.

Säkerhet och försiktighetsåtgärder

Varje gång en kemikalie kommer i kontakt med huden, ögonen, etc. .. skölj noga med vatten och vid behov, kontakta en läkare så snart som möjligt.

Om produkten oavsiktligt förtärs, tvätta munnen rikligt med vatten. Drick icke kolsyrat vatten och vid behov, kontakta en läkare så snart som möjligt.

I allmänhet bör alla blandningar av kemikalier undvikas, i synnerhet en alkalisk med en syra, eftersom denna blandning ger upphov till en mycket farlig exoterm reaktion.

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt på begäran