


Anvendelse



ZooLac® PROPASTE® gives når der ønskes en bedre fordøjelse eller en mere stabil tarmflora.




I nye situationer fx stress, transport, ændring i foder, støtte ved ukompliceret diarré m.m.



Ved genopretning af tarmsystemet fx efter eller sammen med en antibiotisk behandling.



Kan også bruges forebyggende. ZooLac® PROPASTE® er et naturligt produkt og kan ikke overdoseres.



ZooLac® PROPASTE®'s unikke sammensætning gør det til markedets bedste i sin gruppe.



3 virkninger i samme dosering.



Enestående praktiske resultater gennem mere end 15 år.



Sikkert gennemprøvet produkt med stor succes.



A.C. Illumsvej 6 · DK-8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 75 22
www.chemvet.dk · info@chemvet.dk



Pet Care



ZooLac® PROPASTE®

Til stabilisering af fordøjelsen og afbalancering af bakteriefloraen i mave-tarmkanalen

- 3 virkninger i samme dosering.
- Enestående praktiske resultater gennem mere end 15 år.
- Sikkert gennemprøvet produkt - med stor succes
- Markedets bedste - i sin gruppe.

Hvordan virker ZooLac® PROPASTE®

Stabiliserer fordøjelsen

ZooLac® PROPASTE® stabiliserer fordøjelsen og afbalancerer bakteriefloraen i mavetarmkanalen gennem et samarbejde mellem gavnlige bakterier og dyrets eget immunforsvar.

Afbalanceret tarmflora

ZooLac® PROPASTE® fremmer de naturligt forekommende gavnlige bakterier med veldefineret effekt.

Den samlede effekt bliver derfor meget bred og sikrer den enestående virkning hos dyret.

Kontrollér væsketab - virker hurtigt

ZooLac® PROPASTE® unikke sammensætning virker primært ved, at de skadelige bakterier hindres i at angribe tarmvæggen. Samtidig angriber de gavnlige bakterier de skadelige. Angrebet består i naturlig konkurrence som begrænser de skadelige bakteriers vækst.

Ingen udvikling af resistens

ZooLac® PROPASTE®'s virkemåde betyder, at de skadelige bakterier ikke kan udvikle resistens, som det kan ske ved antibiotika-behandling.

Brugsanvisning

ZooLac® PROPASTE® tildeles ved hjælp af den betjeningsvenlige doseringssprøjte, som udgør produktets emballage. Inden tildeling indstilles sprøjten på den ønskede mængde, som ses af doseringsskemaet. Den afmålte mængde ZooLac® Propaste® placeres på dyrets tunge eller ovenpå foderet. Selve tildelingen foregår let, idet dyrene kan lide ZooLac® PROPASTE®.

ZooLac® PROPASTE® opbevares ved almindelig stuetemperatur.

Hvis produktet opbevares i køleskab skal det tempereres til stuetemperatur før brug.

Naturligt produkt

ZooLac® PROPASTE® er et naturligt produkt og kan ikke overdoseres.

Dosering

Doseringen er angivet i nedenstående skema.

Dyrets vægt	Dosering	Dyrlægens notater
0-10 kg	1 ml	
10-25 kg	2 ml	
25-50 kg	3 ml	
Over 50 kg	5 ml	