

Liq-io concentrate

**Desinfektion af dievorter på mælkeproducerende dyr ved neddykning,
skumpåføring eller sprøjtning inden malkning**

**Desinfektion af dievorter på mælkeproducerende dyr ved neddykning,
skumpåføring eller sprøjtning efter malkning**

Koncentreret væske udelukkende til professionelt brug

Manuel eller automatisk påføring - indendørs

BIOCIDHOLDIGT PRODUKT - Aktive substanser per 100 g af produktet : Jod 2,5g ; CAS nummer 7553-56-2 ;

EF-nummer 231-442-4

HOVEDGRUPPE 1: Desinfektionsmidler og biocidholdige produkter generelt; Produkttype 3: Biocidholdige produkter til veterinærhygiejne. SL - Vandopløseligt koncentrat. Tilladelsesnummer : EU-0018397-0005 1-3

PRÆSENTATION

- . Uigennemsigtig ensartet væske, Kastanjebrun
- . Ren pH : $4 \pm 0,7$
- . pH ved 10 g/l : Ikke disponibelt
- . Densitet ved 20° C : $1,11 \pm 0,01$ g/cm³
- . Frysepunkt : -10 °C

Kersia Skandinavien A/S - ASSENSVEJ 156
5500 MIDDELFART

Tel : 64 47 35 00 Fax : 64 47 33 11
e-mail : kersia.dk@kersia-group.com

EGENSKABER

- . Iode: 25000 mg/kg i form af jodofor
- . Blege- og blødgørende midler: glycerin, derivat af lanolin
- . Skumdannende midler
- . pH-regulerende middel

ANVENDELSE

Før eller efter malkning

Dosering for det fortyndede produkt: - køer og bøfler: 3 til 10 ml (5 til 8 ml anbefales) - får: 1,5 til 5 ml (1,5 til 3 ml anbefales) - geder: 2,5 til 6 ml (2,5 til 4 ml anbefales)

Hyppighed: 2 til 3 gange om dagen

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Produktet skal have en temperatur på over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til påfyldning af produktet i påføringsudstyret. Fyld neddypnings-/skumpåføringskoppen/-sprøjten manuelt eller automatisk med den klargjorte fortynding.

Om nødvendigt gentages påføringen ved hver malkning

Rengør påføringsudstyret regelmæssigt med lunkent vand.

FØR MALKNING

Klargør en fortynding på 10 % (%vol: 10 ml produkt, tilføj vand op til 100 ml) for bakteriedræbende og gærdræbende virkning.

Fyld neddypnings-/skumpåføringskoppen/-sprøjten manuelt eller automatisk med den klargjorte fortynding.

Fjern alt synligt snavs, inden produktet påføres.

Manuel eller automatisk neddykning/skumpåføring/sprøjtning på dyrets dievorte i hele dievortens længde inden malkning.

Lad produktet virke i mindst et minut.

Brug metoden til rengøring og aftørring af dievorten systematisk, inden pattekopsættet påsættes.

EFTER MALKNING

Klargør en fortynding på 10 % (%vol: 10 ml produkt, tilføj vand op til 100 ml) for bakteriedræbende, gærdræbende og algedræbende virkning eller 20 % (%vol: 20 ml produkt, tilføj vand op til 100 ml), hvis virusdræbende virkning også er nødvendig.

Fyld neddypnings-/skumpåføringskoppen/-sprøjten manuelt eller automatisk med den klargjorte fortynding.

Manuel eller automatisk neddykning/skumpåføring/sprøjtning på dyrets dievorter i hele dievortens længde efter malkning.

Lad produktet sidde indtil næste malkning. Sørg for, at kørerne står op, indtil produktet er tørret. (mindst 5 minutter)

Ved næste malkning bruges metoden til rengøring og aftørring af dievorten systematisk, inden pattekopsættet påsættes.

Må ikke opbevares ved en højere temperatur end 30 °C.

SALGSINDPAKNINGER

Dunk 5l Sort 5kg (karton 4x5 kg)

Dunk 10l Sort 10kg

Dunk 22l Sort 20kg

Tromle 60l Mørkeblå 60kg

Tromle 120l Mørkeblå 120kg

Tromle 220l Mørkeblå 220kg

Engangs container 1000l Sort 1000kg

Brug produktet inden for 24 måneder fra datoen for fremstilling.

Opbevares et rent, ventileret og køligt sted, langt fra varmekilder og stærkt lys.

SIKKERHED

Konsulter sikkerhedsdatablad tilgængeligt på internettet :

<http://www.hypred.com>

LOVGIVNING

Biocidholdige produkter skal anvendes på forsvarlig måde. Læs først etiketten og oplysninger om produktet.