



Brugsvejledning i malkekvægproduktion

Bredspektret Desinfektionsmiddel

Dokumenteret effekt mod Oocyster (cryptosporidier og coccidier), nematode æg(orm), sygdomsfremkaldende virus, bakterier, gær og svampe

Desinfektionsmiddel til bygninger; overflader og inventar i husdyrbrug, fodtøj, transportmidler og køretøjer. Biocid PT3(Produkttype 3)

V-Oocid er et effektivt valg, når der ønskes kraftig og bredspektret effekt. Rengør først for synligt snavs og vask med tilhørende sæbe (DT Foam) inden desinfektion


Primære anvendelsesområder i malkekvægbesætninger:

V-Oocid anvendes til:

- Desinfektion af kalvehytter og kælvningsbokse
- Desinfektion af overflader specielt i kalve- og ungdyr områder uden dyr til stede.
- Desinficerende støvlebad
- Desinfektion af transportmidler og køretøjer (dyretransporter, traktorer og maskiner)
- Desinfektion omkring kadaverpladser

V-Oocid reducerer Oocyst populationen med 98,9%:

2% opløsning udlagt som skum med indvirkningstid på 2 timer



Mærkning af biocidholdige produkter (forordning (EF) nr. 528/2012) :

Produkttype 3: Veterinærhygiejne. Flydende. Biocidaktivstof:

Chlororesol (CAS: 59-50-7) 170.00 g/kg - Glykolsyre (CAS: 79-14-1) 49.00 g/kg HUVEPHARMA SA, 34 rue Jean Monnet • Z.I. d'Étriché • Segré • 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU • FRANCE • Tel.: +33 (0)2 41 92 11 11 • info.france@huvepharma.com

HUVEPHARMA EOOD. 3a Nikolay Haytov Str, 1113 Sofia, Bulgaria.

P: +359 2 862 5334 sales@huvepharma.com

DK: Susanne Nordby M: +45 20232456 / susanne.nordby@huvepharma.com




Anvendelse	Koncentration	Product Type	Dosering
Desinfektion af overflader mod: Oocyster Cryptospridier Coccodier Nematode æg(orm)	2,0% (20ml/L vand)	PT3	Anvend en højtryksrensers eller andet mekanisk sprøjteudstyr med lavt tryk. Ved fladedesinfektion anvend 200-400 ml/m ² eller indtil det begynder at løbe. Desinficer flader op til over dyrenes højde. Lad desinfektionen virke i 2 timer. Ved temperaturer under 10 grader forlænges virketiden. Opløsningen kan også anvendes til nedsænkning af løst inventar og udstyr.
Desinfektion af overflader mod: Virus, bakterier og svampe	1,5% (15 ml/L vand)	PT3	Anvend en højtryksrensers eller andet mekanisk sprøjteudstyr med lavt tryk. Ved fladedesinfektion anvend 100-300 ml/m ² eller indtil det begynder at løbe. Lad desinfektionen virke i 60 min. Ved temperaturer under 10 grader forlæng virketiden. Opløsningen kan også anvendes til nedsænkning af løst inventar og udstyr.
Desinfektion af køretøjer og hjul	2,0% (20 ml/L vand)	PT3	Anvend en højtryksrensers eller andet mekanisk sprøjteudstyr med lavt tryk. Tilføj V-Oocid opløsningen med 100 - 200ml/m ² , eller til overfladen er gennemfugtet og til væsken begynder at løbe. Lad desinfektionen virke i 5 min. Ved temperatur under 10 grader forlæng virketiden.
Støvlebad	2% (20ml/L vand)	PT3	Virketid 1 min. Ved temperatur under 10 grader forlæng virketiden. Udskift opløsningen enten når den er meget snavset eller efter 100 passager/efter 7 dage.

Desinfektionsmiddel, flydende produkttypeanvendelse; PT3 (veterinærhygiejne)

Total mængde færdigblandet desinfektionsopløsning	Blandings procent	
	2,0 %	1,5%
	Mængde af V-Oocid der skal tilsættes	
10L	200ml	150ml
50L	1000ml	750ml
100L	2 L	1,5 L
200L	4L	3 L



Støvlebad:



FORHOLDSREGLER

Brug desinfektionsmidler sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationer før brug. Opbevares koldt og tørt med tæt lukket låg.

Lad ikke koncentrat eller opløsninger løbe direkte i vandløb. Bland ikke med andre kemikalier, undtagen dem som er anbefalet af fabrikanten. Skyl udstyr efter brug.

Anvend rent og korrekt vedligeholdt personligt beskyttelsesudstyr ifølge obligatoriske piktogrammer herunder. Ved sprøjtning skal der anvendes partikelfilter P2(hvid) mod dampe og partikler.



FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt: Hvis gener/symptomer fortsætter eller i tvivlstilfælde søges læge.

Inhalering: Flyt personen til frisk luft. Kontakt læge ved indåndingsbesvær.

Hudkontakt: Vask straks med rigeligt vand. Kontakt en læge hvis huden er skadet.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand og søg læge. Vis etiketten.

Indtagelse: Forsøg ikke at få personen til at indtage noget. Til kald lægehjælp, og vis etiketten.

Leverandør:

Firma : HUVEPHARMA SA.

Adresse : 34 rue Jean Monnet , Z.I. d'Etriché, Segré .49500.SEGRE-EN-ANJOU BLEU.France.

Telefon : +33 (0) 2 41 92 11 11. Fax : +33 (0) 2 41 61 04 59.

E-mail : info.france@huvepharma.com

Giftlinien DK : 82 12 12 12