

VULKAN[®] MAX

Biosecurity solutions

Bredspektret desinfektionsmiddel
- til tomme stalde

Omkostnings-
effektivt

Højkoncentreret
Lav dosering

Hurtigvirkende

Virker bl.a. mod
Salmonella
AI
ASFV

Bredspektret
Dokumenteret
effekt på virus,
bakterier, gær og
svampe

Noficeret i ECHA

PT2
PT3
PT4

God skumeffekt





Brugsvejledning

Bredspektret Desinfektionsmiddel

Højkoncentreret desinfektionsmiddel med omfattende dokumenteret effekt på sygdomsfremkaldende virus, bakterier, gær og svampe. (f.eks. E. Coli, Salmonella typhimurium, PRRS, AI, ASF og Candida Albicans). Vulkan Max skummer effektivt, så det er let at se arbejdsområdet.


Anvendelse

Anvendelse; Biocid til erhvervmæssig brug notificeret til ECHA:

PT2: Generel desinfektion af overflader og udstyr i forbindelse med industriarealer, veterinærklinikker etc.

PT3: Desinfektion af bygninger til husdyrhold og relateret udstyr samt køretøjer til dyretransport.

PT4: Desinfektion af overflader i kontakt med fødevarer



Vulkan Max er ideel til:

- desinfektion af overflader i tomme stalde
- desinfektion af inventar, udstyr
- desinfektion af alle typer overflader
- desinfektion af køretøjer, f.eks. Lastbiler, traktorer og vogne
- desinficerende støvlebad
- desinficerende hjulbad
- desinfektion af kadaver-pladser
- kold- og varmtåge desinfektion
- desinfektion ved iblødsætning i brugsopløsningen



Anvendelse	Koncentration	Dosering
Fladedesinfektion ved på sprøjtning	0,6% (6 ml/L vand)	Anvend en højtryksrenser eller andet mekanisk sprøjteudstyr. Tilføj Vulkan [®] Max opløsningen med 200 – 300 ml/m ² , eller til overfladen er gennemfugtet og til væsken begynder at løbe. Virketid 30 min.
Fladedesinfektion ved iblødsætning	0,6% (6 ml/L vand)	Læg det rengjorte udstyr og løst inventar ned i opløsningen og tillad en virketid på 30 min.
Støvlebad og Hjulbad	0,6% (6 ml/L vand)	Udskift opløsningen 1 – 2 gange om ugen, afhængig af forurening med organisk materiale i opløsningen
Tågedesinfektion Varm/kold tåge	1 ml Vulkan [®] Max /m ³ 3.00 L Vulkan [®] Max /3000 m ³	Beregn mængden af Vulkan [®] Max der skal anvendes i forhold til luftrummet i bygningen. (Fx.: 1000 m ³ : 1 L Vulkan [®] Max) Rens tågeudstyr med vand efter brug.

Rengør altid for synligt snavs og vask med tilhørende sæbe (DT Foam) inden desinfektion.

Fladedesinfektion. Mængde Vulkan[®] Max der skal anvendes til opgaven:

Total mængde færdigblandet desinfektionsopløsning	Blandings procent 0,6%
	Mængde af Vulkan [®] Max der skal tilsættes
10L	60 ml
50L	3 dl
1000L	6 L
2000L	12 L

Areal 1000 L opløsning rækker til:

Koncentreret opløsning	Doseringsmåler indstilling på højtryksrenser	Ved brug af 200 ml/m ² flade rækker denne opløsning til	Ved brug af 300 ml/m ² flade rækker denne opløsning til
6 L til 1000 L vand	0,6 %	5030 m ²	3353 m ²

Tågedesinfektion Varm/kold tåge. Mængde Vulkan[®] Max der skal anvendes til opgaven:

Total mængde koncentreret Vulkan [®] Max	Koncentrat
	Mængde af Vulkan [®] Max der skal anvendes
100 m ³	1 dl
1000 m ³	1 L
3000 m ³	3 L
5000 m ³	5 L



Indvirkningstid i forhold til opgaven:

Anvendelse Vulkan [®] Max Virus- bakterie- og svampedræbende	Koncentration	Indvirkningstid
Fladedesinfektion	0,6%	30 min
Tågedesinfektion Varm/koldtåge	1 ml / m ³	60 min

FORHOLDSREGLER

Brug desinfektionsmidler sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationer før brug.

Efter endt desinfektion af overflader der kommer i kontakt med fødevarer, skal der skylles efter med rent vand.

Opbevares koldt og tørt med tæt lukket låg. Lad ikke koncentrat eller opløsninger løbe direkte i vandløb. Bland ikke med andre kemikalier, undtagen dem som er anbefalet af fabrikanten

Skyl udstyr efter brug. Personer uden passende værnemidler må ikke opholde sig i rum under anvendelse af produktet, før spraytågen er opløst.

Anvend rent og korrekt vedligeholdt personligt beskyttelsesudstyr ifølge obligatoriske piktogrammer herunder.



FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt: Ved symptomer eller i tvivlstilfælde søges læge.

Inhalering: Flyt personen til frisk luft. Kontakt læge ved ubehag.

Hudkontakt: Vask straks med rigeligt vand. Kontakt en læge hvis huden er irriteret.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i 15 min, hold øjenlåg åbne og søg læge. Vis etiketten.

Indtagelse: Forsøg ikke at få personen til at indtage noget. Tilkald lægehjælp ved utilsigtet indtagelse, og lad lægen vurdere behovet for overvågning og eventuel senere behandling på hospital.

Vis lægen etiketten. Giftlinien DK: 82 12 12 12

Vulkan[®]Max findes i følgende pakninger: 20L

Biocidaktivstof: Didecyldimethylammoniumchlorid -CAS n° 7173-51-5: 17 g/L. Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid -CAS n° 68424-85-1: 160 g/L.

Glutaraldehyd -CAS n° 111-30-8: 143 g/L

Desinfektionsmiddel, flydende til produkttypeanvendelse; PT2 (overfladedesinfektion), PT3 (veterinærhygiejne), PT4 (fødevarer og foderstoffer)