

VikAcid Milk Trolley

DK:

Anvendelse: Flydende surt rengøringsmiddel til malke- og køleudstyr bygget på en optimal blanding af salpetersyre og lavtkummende tensid og giver maksimal afkalkning og rengøringseffekt, samtidig med at den er mild for materialerne i udstyret på samme tid. Bruges skiftevis med VikAlka Milk Trolly rengøringsmiddel, hvor ofte afhænger af vandets hårdhed.

Dosering: 0,5 – 1,0 dl pr. 10 liter vand (0,5-1%). Tilsæt altid syre til vand, aldrig omvendt.

Efter malkning tømmes anlægget for resterende mælkeester. Skyl med varmt vand (35-45 °C). Doser VikAcid Milk Trolly i varmt vand (60-75 °C). Cirkulér i 7-10 minutter. Sørg for, at temperaturen forbliver over 40 °C i hele kredsløbet. Kontroller malkecentral og vandstrøm, tøm systemet for vaskeopløsningen. Skyl systemet med koldt drikkevand. Lad systemet tørre.

Indhold: Under 5%: Amfotere overfladeaktive stoffer.

pH-Værdi: Ca. 0,8 i koncentrat.

Vægtfylde: 1,13 g/cm³

Pr nr.: Under udarbejdelse.

Indeholder: Salpetersyre. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Farlig ved indånding. Indånd ikke damp/tåge. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær ansigtsbeskyttelse/ beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

SE:

Användning: Flytande syra diskmedel för mjölkknings- och kylutrustning, baserat på en optimal blandning av salpetersyra och låg skummande tensid som ger en maximal avkalknings- och rengöringseffekt samtidigt som det är skonsamt mot utrustningen. Används växelvis med VikAlka Milk Trolley från en gång i veckan till varannan rengöring beroende på vattnets hårdhet.

Dosering: Använd 0,5–1,0 dl per 10 liter vatten (0,5–1 %). Tillsätt alltid syran i vattnet, aldrig tvärtom.

Töm mjölkkningsanläggningen på kvarvarande mjölkrester efter avslutad mjölkning. Skölj därefter med varmt vatten (35–45 °C) för att därefter dosera VikAcid Milk Trolley i hett vatten (60–80 °C) och låt det cirkulera i 7–10 minuter. Temperaturen skall vara över 40 °C under cirkulationsdisken. Kontrollera mjölkkningsanläggningen och vattenflödet och töm sedan anläggningen på diskvattnet. Spola därefter igenom anläggningen med kallt vatten.

Innehåll: < 5%: Amfotära tensider.

pH-värde: Ca. 0,8 i koncentrat.

Densitet: 1,13 g/cm³

Innehåller: Salpetersyra. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadligt vid inandning. Inandas inte ångor/dimma. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd ansiktsskydd/ skyddshandskar/skyddskläder. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas enlighet med lokala bestämmelser.



Fare/Fara

UFI: JU7Q-AQFS-9UM9-SWEM

UN 2031

NITRIC ACID



VIKING[®]

Argo Food Park 12
8200 Aarhus
Tlf.: 8728 2000

10 L