



Elanco

DISPARID®
Fly Granular Bait

BRUG DISPARID NU! TIL EFFEKTIV FLUEBEKÆMPELSE

VIGTIGHEDEN AF EFFEKTIV FLUEBEKÆMPELSE

Fluer forårsager stress og rastløshed. Konstant jagt efter fluer koster energi. Dette kan føre til lavere foderudnyttelse og dermed tab af produktionsresultater.¹ Fluer kan også være bærere af patogener såsom vira, bakterier, svampe og parasitter.¹ Fluebekæmpelse er et vigtigt led i en effektiv smittebeskyttelse og dermed minimere negative følger.



Brugsanvisning Disparid:

Disparid (Indoxacarb) – granuleret produkt til at bekæmpe husfluer (*Musca domestica*, voksne) og spyfluer (*Calliphoridae sp.*, voksne)

Brugsanvisning: Som lokkemiddel i en lokkemiddelstation

- ▶ Placeres indendørs.
- ▶ I og omkring landbrugs- eller husdyrhold (undtagen slagtekyllinger).
- ▶ I og omkring bolig- og erhvervsbygninger.
- ▶ Lokkemiddelstationer skal placeres hævet fra jorden, monteres på væggen eller ophænges.
- ▶ Rengør ikke lokkemiddelstationerne eller målebægere med vand, da rester ikke må udledes til vandmiljøet.

Dosering:

40 g produkt pr. station
1 lokkemiddelstation / 20 m² (svarer til 2 g/m²)
Fortyndes ikke



Hyppighed og tidspunkt for tilsætning:

Behandlede områder bør efterses hver uge. Hvis lokkemiddel er blevet fuldstændig opbrugt, og der stadig er aktivitet, gentages behandlingen.

På grund af indoxacarbs virkningsmåde kan fluedødeligheden blive forsinket med op til 72 timer.





DISPARID[®] Fly Granular Bait

Pakkestørrelse og opbevaring:

- ▶ Flaske, 500 g, HDPE.
Opbevar produktet mørkt.
Holdbarheden er to år.

Faresætninger:

- ▶ Kan forårsage en allergisk hudreaktion.
- ▶ Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Sikkerhedsanvisninger:

- ▶ Undgå indånding af støv.
- ▶ Forurenede arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- ▶ Undgå udledning til miljøet.
- ▶ Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
- ▶ VED KONTAKT MED HUDEN:
Vask med rigeligt vand og sæbe.
- ▶ Hvis der opstår hudirritation eller udslet:
Søg lægehjælp.
Specifik behandling.
- ▶ Tag forurenede tøj af og vask det før det genbruges.

Instruktioner for sikker bortskaffelse af produktet og dets emballage:

- ▶ Bortskaf ubrugt produkt, dets emballage og alt andet affald (udtømte lokkemadstationer, døde fluer i og omkring lokkemiddelstationen), i henhold til lokale regler.
- ▶ Udled ikke ubrugt produkt på jorden, i vandløb, i rør (vask, toiletter...) eller ned i afløb.

Til professionelt brug.

Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.

Reference:

1 Reissert-Oppermann, S., Hildebrand, J., Jandowsky, A., Steuber, S., Bauer, B., Clausen, P. 2020. Insektizidresistenzen bei Stubenfliegen (*Musca domestica*) und Wadenstechern (*Stomoxys calcitrans*), Tierärztliche Umschau. Ausgabe 1-2/2020.



VIGTIG

- ▶ Start behandlingen tidligt i fluesæsonen.
- ▶ Hvis lokkemidlet er fuldstændigt forbrugt, og der stadig er aktivitet, skal behandlingen gentages.
- ▶ På grund af indoxacarb's virkningsmåde kan fluedødeligheden blive forsinket med op til 72 timer.